

ブレーザベスカプセル 100mg

【この薬は？】

販売名	ブレーザベスカプセル 100mg BRAZAVES 100mg
一般名	ミグルスタット Miglustat
含有量 (1 カプセル中)	100mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するとき特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、「医薬品医療機器情報提供ホームページ」
<http://www.info.pmda.go.jp/> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、グルコシルセラミド合成酵素阻害剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、脳に脂質が過剰に蓄積するのを抑えて眼球の動きを改善し、食べ物の飲み込み、歩行、知能などの障害の進行を抑えます。
- ・次の病気の人に処方されます。
ニーマン・ピック病C型
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人

- ・過去にブレーザベスカプセルに含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。
- ・腎臓に障害がある人
 - ・肝臓に障害がある人
 - ・胃腸障害のある人
 - ・高齢の人
- この薬の使用により、末梢性ニューロパチー（しびれ感、ピリピリ感）があらわれることがあるので、この薬の使用前に神経の検査が行われます。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量および回数は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。小児の場合は体表面積（身長と体重から計算）もあわせて、医師が決めます。通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

〔成人の場合〕

一回量	2カプセル
飲む回数	1日3回

〔小児の場合〕

体表面積(m ²)	一回量	飲む回数
0.47以下	1カプセル	1日1回
0.47を超え0.73以下	1カプセル	1日2回
0.73を超え0.88以下	1カプセル	1日3回
0.88を超え1.25以下	2カプセル	1日2回
1.25を超える	2カプセル	1日3回

腎臓に障害のある人においては、腎機能の程度に応じて飲む量が決められます。

●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

白血球減少、好中球減少、浮動性めまい（ふらつき）、感覚の異常（しびれ感、ピリピリ感）などがあらわれる可能性があります。異常を感じたら、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬を6～12ヵ月間使用しても効果が得られない場合は、使用が中止されることがあります。
- ・腎臓に障害のある人においては、使用量の調節のために、定期的に腎機能検査が行われます。

- ・浮動性めまい（ふらつき）があらわれることがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作をしないようにしてください。
- ・下痢があらわれることがあるので、下痢があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。食事内容の変更（炭水化物を多く含む食事を避けるなど）などを医師から指導されることがあります。
- ・末梢性ニューロパチー（しびれ感、ピリピリ感）があらわれることがあるので、これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。飲み始める前と、飲み始めてからは6ヵ月ごとに神経の検査が行われます。
- ・振戦（ふるえ）があらわれることがあります。振戦があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・血小板減少（皮下出血、出血が止まりにくいなど）があらわれることがあるので、定期的に血液検査が行われます。これらの症状があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・パートナーが妊娠する可能性がある男性がこの薬を使用する場合には避妊してください。また、この薬の使用を中止してからも3ヶ月間は避妊してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人にはこの薬を使うことができません。この薬を使用している間に妊娠がわかった場合には、すぐに主治医に相談してください。妊娠を希望する場合も、主治医に相談してください。
- ・小児において成長の遅れがあらわれることがあるので、成長期の患者さんは定期的に身長および体重の測定が行われます。
- ・授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？


特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
重度の下痢 じゅうどのげり	汗をかく、吐き気、激しい腹痛、水のような便、泥状の便

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	汗をかく
口や喉	吐き気
胸部	吐き気
腹部	激しい腹痛、吐き気
便	水のような便、泥状の便

【この薬の形は？】

形状	
直径	14mm
短径	6.5mm
重さ	149mg
色	白色
識別コード (カプセル)	OGT 918 100
識別コード (シート)	ブレーザバス カプセル 100mg または BRAZAVES capsules 100mg

【この薬に含まれているのは？】

有効成分	ミグルスタット
添加物	デンプン、グリコール酸ナトリウム、ポビドン、ステアリン酸、マグネシウム

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社
(<http://www.actelion.co.jp>)

DI センター

電話：0120-056-155

受付時間：9時～17時30分（土、日、祝日、当社休業日を除く）